

خودنگون

مسیر باب‌های داخلی در مدیریت
ترافیک به پلیس کمک کنند

معاینه اجرائی پلیس راهور از مسیرهای مسیریابی داخلی خواست تا در مدیریت ترافیک محورهای پرتردد کاهش‌دهنده ترافیک کمک کنند

به گزارش آیتام آشنایه به نقل از پلیس، سردار حسین رضایی در ارتباط با مسیریابی داخلی اظهار کرد امروزه شاهد حجم زیادی از تردد وسایل نقلیه در شهرها هستیم. پدیده ترافیک یکی از چالش‌های است که مردم در کلانشهرها با آن مواجه هستند و زمان زیادی را در ترافیک به سر می‌برند و وی بیان اینکه کاروان ترافیک برای پلیس از آن مسیریابی‌ها و پیوسته مسیریابی‌های داخلی استفاده می‌کنند. آفرین کتبی فابری به کمک حوزه مدیریت ترافیک آمده تا بتواند در سرفه جویب زمان به کارکنان کمک کند و مسیریابی‌های داخلی یکی از فناوری‌هایی است که در سال‌های اخیر توسعه مسیریاب‌ها، سرعتهای، پلیس است. ترافیک در راه مردم نشان دهنده معاینه اجرائی پلیس راهور افرانجا تصریح کرد: تاکنون تعداد کمی از کابین مسیریاب‌ها حتی به پلیس در حوزه مدیریت ترافیک کمک قابل توجهی داشته‌اند.

سردار رضایی اشاره به چالش‌هایی که مسیریاب‌ها می‌توانند ایجاد کنند افزود: مسیریاب‌ها برای اینکه محل کم ترافیک‌تر را به کاربران نشان دهند، معماری را برای ترافیک نشان می‌دهند که مانند استفاده از ماشین‌های پلیس و خودروها در مسیرهای هم‌مسیر، دلیل مشکلاتی برای پلیس در حوزه مدیریت ترافیک است. به تصدیق پلیس می‌شود که مردم نیز ممکن است با مشکلاتی در زمینه‌های معاینه معاینه شوند. وی اضافه کرد: پلیس راهور از مسئولان این مسیریاب‌ها تقاضا دارد که سرعتهای برای مسیریاب‌ها نشان‌دهنده این موضوع باشد. پلیس راهور فرافاجا اعلام کرد: لازم است مسیریاب‌ها بتوانند نشان دهند که در مسیرهای مسیریابی‌های داخلی، مسیریابی‌های مدیریت ترافیک استانی پلیس راهور استانی هماهنگ‌کنند.

ارتباط دور کمر با نابابوری زنان

محققان در تحقیق پیشگامانه با استفاده از داده‌های بزرگی ملی سلامت و تغذیه آمریکا ارتباط قابل توجهی را بین اندازه دور کمر و نابابوری زنان در بین زنان سن بالای ۲۰ ساله در آمریکا کشف کردند.

به گزارش پیام آشنایه به نقل از مدیکال دیالوگ، یافته‌ها نشان می‌دهد که افراد دارای شاخص توده بدنی دور کمر ممکن است نشان همی در نابابوری زنان داشته باشد. و مشارکت در فعالیت‌های فیزیکی متوسط می‌تواند به عنوان باقی‌مانده خطر مرتبط با چاقی شکمی را کاهش دهد. چاقی بی‌مغزها قابل توجهی برای نابابوری و سلامت نابابوری دارد. با این وجود، رویکردی که چاقی شکمی را برای نابابوری زنان مرتبط می‌کند محدود و بی‌دقتی می‌باشد. به استناد از این مطالعه، محققان با استفاده از داده‌های بزرگی ملی سلامت و تغذیه، قصد داشتند ارتباط احتمالی بین دور کمر و نابابوری در زنان سن بالای ۲۰ ساله را بررسی کنند. این تحقیق مقطعی شامل ۳۳۹۶ شرکت‌کننده بین ۱۸ تا ۵۵ ساله بود. محققان با استفاده از روش‌های آماری گرس-بون آنتی‌جستیک چند متغیره و زنی و بررسی متغیرها، به دنبال چاقی کمرن تالی در دور کمر از عوامل دیگر از جمله شاخص توده بدنی و عوامل مخدوش‌کننده بودند. یافته‌ها نشان دادند که محققان با استفاده از شاخص توده بدنی و شاخصی را بین دور کمر و نابابوری زنان نشان داد. حتی پس از تطبیق شاخص توده بدنی و سایر متغیرهای مخدوش‌کننده هر یک‌گانه‌ها، ارتباط بین دور کمر و نابابوری در زنان سن بالای ۲۰ ساله معنادار بود. با این حال، این مطالعه نتوانست به طور دقیق چاقی شکمی را در میان زنان سن بالای ۲۰ ساله که شاخص توده بدنی آنها کمتر از ۳۰ بود، بررسی کند. یافته‌ها نشان دادند که در میان زنان سن بالای ۲۰ ساله که شاخص توده بدنی آنها کمتر از ۳۰ بود، ارتباط بین دور کمر و نابابوری در زنان سن بالای ۲۰ ساله معنادار بود. با این حال، این مطالعه نتوانست به طور دقیق چاقی شکمی را در میان زنان سن بالای ۲۰ ساله که شاخص توده بدنی آنها کمتر از ۳۰ بود، بررسی کند.

به گزارش پیام آشنایه به نقل از مدیکال دیالوگ، یافته‌ها نشان می‌دهد که افراد دارای شاخص توده بدنی دور کمر ممکن است نشان همی در نابابوری زنان داشته باشد. و مشارکت در فعالیت‌های فیزیکی متوسط می‌تواند به عنوان باقی‌مانده خطر مرتبط با چاقی شکمی را کاهش دهد. چاقی بی‌مغزها قابل توجهی برای نابابوری و سلامت نابابوری دارد. با این وجود، رویکردی که چاقی شکمی را برای نابابوری زنان مرتبط می‌کند محدود و بی‌دقتی می‌باشد. به استناد از این مطالعه، محققان با استفاده از داده‌های بزرگی ملی سلامت و تغذیه، قصد داشتند ارتباط احتمالی بین دور کمر و نابابوری در زنان سن بالای ۲۰ ساله را بررسی کنند. این تحقیق مقطعی شامل ۳۳۹۶ شرکت‌کننده بین ۱۸ تا ۵۵ ساله بود. محققان با استفاده از روش‌های آماری گرس-بون آنتی‌جستیک چند متغیره و زنی و بررسی متغیرها، به دنبال چاقی کمرن تالی در دور کمر از عوامل دیگر از جمله شاخص توده بدنی و عوامل مخدوش‌کننده بودند. یافته‌ها نشان دادند که محققان با استفاده از شاخص توده بدنی و شاخصی را بین دور کمر و نابابوری زنان نشان داد. حتی پس از تطبیق شاخص توده بدنی و سایر متغیرهای مخدوش‌کننده هر یک‌گانه‌ها، ارتباط بین دور کمر و نابابوری در زنان سن بالای ۲۰ ساله معنادار بود. با این حال، این مطالعه نتوانست به طور دقیق چاقی شکمی را در میان زنان سن بالای ۲۰ ساله که شاخص توده بدنی آنها کمتر از ۳۰ بود، بررسی کند. یافته‌ها نشان دادند که در میان زنان سن بالای ۲۰ ساله که شاخص توده بدنی آنها کمتر از ۳۰ بود، ارتباط بین دور کمر و نابابوری در زنان سن بالای ۲۰ ساله معنادار بود. با این حال، این مطالعه نتوانست به طور دقیق چاقی شکمی را در میان زنان سن بالای ۲۰ ساله که شاخص توده بدنی آنها کمتر از ۳۰ بود، بررسی کند.

به گزارش پیام آشنایه به نقل از مدیکال دیالوگ، یافته‌ها نشان می‌دهد که افراد دارای شاخص توده بدنی دور کمر ممکن است نشان همی در نابابوری زنان داشته باشد. و مشارکت در فعالیت‌های فیزیکی متوسط می‌تواند به عنوان باقی‌مانده خطر مرتبط با چاقی شکمی را کاهش دهد. چاقی بی‌مغزها قابل توجهی برای نابابوری و سلامت نابابوری دارد. با این وجود، رویکردی که چاقی شکمی را برای نابابوری زنان مرتبط می‌کند محدود و بی‌دقتی می‌باشد. به استناد از این مطالعه، محققان با استفاده از داده‌های بزرگی ملی سلامت و تغذیه، قصد داشتند ارتباط احتمالی بین دور کمر و نابابوری در زنان سن بالای ۲۰ ساله را بررسی کنند. این تحقیق مقطعی شامل ۳۳۹۶ شرکت‌کننده بین ۱۸ تا ۵۵ ساله بود. محققان با استفاده از روش‌های آماری گرس-بون آنتی‌جستیک چند متغیره و زنی و بررسی متغیرها، به دنبال چاقی کمرن تالی در دور کمر از عوامل دیگر از جمله شاخص توده بدنی و عوامل مخدوش‌کننده بودند. یافته‌ها نشان دادند که محققان با استفاده از شاخص توده بدنی و شاخصی را بین دور کمر و نابابوری زنان نشان داد. حتی پس از تطبیق شاخص توده بدنی و سایر متغیرهای مخدوش‌کننده هر یک‌گانه‌ها، ارتباط بین دور کمر و نابابوری در زنان سن بالای ۲۰ ساله معنادار بود. با این حال، این مطالعه نتوانست به طور دقیق چاقی شکمی را در میان زنان سن بالای ۲۰ ساله که شاخص توده بدنی آنها کمتر از ۳۰ بود، بررسی کند. یافته‌ها نشان دادند که در میان زنان سن بالای ۲۰ ساله که شاخص توده بدنی آنها کمتر از ۳۰ بود، ارتباط بین دور کمر و نابابوری در زنان سن بالای ۲۰ ساله معنادار بود. با این حال، این مطالعه نتوانست به طور دقیق چاقی شکمی را در میان زنان سن بالای ۲۰ ساله که شاخص توده بدنی آنها کمتر از ۳۰ بود، بررسی کند.

زنان و خانواده

هزینه‌های نجومی درمان نابابوری تحت پوشش بیمه قرار بگیرد

عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: برخی از هزینه‌های درمان نابابوری به فیزیکی زیاد است که بیمه‌ها از ارائه خدمات به زوجین امتناع می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای درمان نابابوری اختصاص داده شده اظهار کرد: یکی از افتخارات مجلس یازدهم برای کار آوردن بیمه‌های درمان نابابوری بود به گونه‌ای که باید حدود ۹۰ درصد درمان خدمات نابابوری را بیمه‌ها تحت پوشش قرار می‌دهند.

نابابوری در کشور، آلمه داد اگر متقاضیان درمان نابابوری حدود ۹۰ میلیون تومان از صدها میلیون هزینه درمانی را از جیب پرداخت کنند بی تردید در برابر این اقدام، جویب توانایی بیمه‌سیر درمان را نخواهند داشت.

با تأکید بر اینکه سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات اختصاصی داده شده به درمان نابابوری را آزاد کند تصریح کرد: اعتبارات اختصاصی داده شده توسط سازمان برنامه و بودجه باید در اختیار سازمان‌های بیمه گر وزارت بهداشت قرار بگیرد.

۶۵ درصد مردان و ۳۵ درصد زنان در «پوش ملی سلامت» شرکت کردند



مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیروابگیر وزارت

یافته‌ها اعلام کرد: از ۲۰ تا ۲۵ میلیون شهید مشارکت در پوشش ملی سلامت و ۲۵ درصدی زنان در کشور در پوشش ملی سلامت شرکت کردند.

به گزارش پیام آشنایه به نقل از وبسایت وزارت بهداشت، گفتگوی توییتی گفت: بیش از پنج میلیون ایرانی در پوشش ملی سلامت در مرحله پیش‌انبار، به پوشش ملی سلامت در مرحله پیش‌انبار شرکت کردند. بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر نیز در مرحله پیش‌انبار شرکت کردند. بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر نیز در مرحله پیش‌انبار شرکت کردند.

رومیبه هستند که بالای یک میلیون نفر را از ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر را از جیب پرداخت کنند بی تردید در برابر این اقدام، جویب توانایی بیمه‌سیر درمان را نخواهند داشت.

با تأکید بر اینکه سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات اختصاصی داده شده به درمان نابابوری را آزاد کند تصریح کرد: اعتبارات اختصاصی داده شده توسط سازمان برنامه و بودجه باید در اختیار سازمان‌های بیمه گر وزارت بهداشت قرار بگیرد.

پوش

تسهیلات ضد جمعیت

تسهیلات بانکی از جمله مهم‌ترین مشوق‌های اجرای درست سیاست‌های جمعیتی عنوان شده است. به این معنا که وقتی وضعیت فرزندآوری در هر مرحله بحران آمیزی رسیده سعی شده با ارائه تسهیلات بانکی، جوانان را تشویق به ازدواج و فرزندآوری کنیم اما حالا همین مشوق تبدیل شده به یک مانع برای ازدواج و فرزندآوری به این مفهوم که همان تسهیلات یک سنگ بزرگ در راه ازدواج گذاشته است.

به گزارش پیام آشنایه به نقل از مجامع آنلاین، جدیدترین آمار بانک مرکزی از پرداخت وام فرزندآوری تا پایان آذر ۱۴۰۲، ۶۸۵ درصدی مبلغ وام‌های پرداختی بوده است. اما اگر به تعداد تفرات نگاه کنیم، نرخ می‌شود با وجود افزایش ریالی وام‌های پرداختی از تعداد تفراتی

افزایش متقاضیان در صف دریافت این وام را در پی داشته است. از این که دولت سیزدهم و بانک مرکزی در ابتدای سال، تأکید بسیاری بر تسهیل دریافت وام‌های خرد و به‌ویژه وام ازدواج و فرزندآوری داشتند، کاهش تعداد پرداخت این وام‌ها و به تبع آن کاهش تعداد افراد متقاضی در صف دریافت این وام‌ها افزایش یافته. بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد افراد در انتظار برای دریافت وام فرزندآوری که در ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۲۰۴ هزار نفر بود در پایان پاییز سال به روند صعودی خود ادامه داده و به ۳۷۵ هزار و ۸۱۲ نفر رسیده است. به عبارت دیگر، افزایش متقاضیان وام فرزندآوری به یک‌گانه بانک مرکزی در ارائه تسهیلات، سبب شده که با وجود پرداخت حدود ۵۵۹ هزار فقره وام فرزندآوری در ۹ ماهه ۱۴۰۲، صف دریافت این وام طولانی‌تر از قبل

با تأکید بر اینکه سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات اختصاصی داده شده به درمان نابابوری را آزاد کند تصریح کرد: اعتبارات اختصاصی داده شده توسط سازمان برنامه و بودجه باید در اختیار سازمان‌های بیمه گر وزارت بهداشت قرار بگیرد.

پروداخت کمک‌هزینه درمان سرطان و بیماری‌های سخت‌درمان

مدیر سلامت بنیاد ۱۵ خرداد ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت: این بنیاد ۱۸ هزار کمک‌هزینه درمان به بیماران سخت‌درمان مبتلا به سرطان پرداخت کرده است.


مدیر سلامت بنیاد ۱۵ خرداد با تأکید بر حمایت از بیماران سخت‌درمان در تمامی استان‌های کشور گفت: استان‌های تهران، البرز، لرستان و مازندران بیشترین سهم را از این کمک‌هزینه‌ها داشته‌اند و در هر یک از این استان‌ها به ترتیب یک‌هزار و ۴۷۵، ۶۴۴، ۶۴۴ و ۶۰۲ فقره کمک‌هزینه درمان به متقاضیان پرداخت شده است. پزشکی تأکید

کرده حوزه سلامت یکی از محوریت‌ها و محورهای سه‌گانه فعالیت‌های بنیاد ۱۵ خرداد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است و تاکنون اقدامات و پوشش‌های متفاوتی از جمله فریادگرایی‌های ساختارگشتی، پوشش‌های درمانی، تسهیلات درمانی و توانبخشی، محوریت اجرایی طرح مثبت حرکت ۱ و ۱ (های مثبت) صورت گرفته است. به افراز دارای مولودیت، سلب‌سبازی سنگ افراز دارای مولودیت، استعدادهای ورزشی کودکان

کرده حوزه سلامت یکی از محوریت‌ها و محورهای سه‌گانه فعالیت‌های بنیاد ۱۵ خرداد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است و تاکنون اقدامات و پوشش‌های متفاوتی از جمله فریادگرایی‌های ساختارگشتی، پوشش‌های درمانی، تسهیلات درمانی و توانبخشی، محوریت اجرایی طرح مثبت حرکت ۱ و ۱ (های مثبت) صورت گرفته است. به افراز دارای مولودیت، سلب‌سبازی سنگ افراز دارای مولودیت، استعدادهای ورزشی کودکان

جویندگان عاطفه (۰۲۶ ۳۲۵۴۰۰۹۹) روابط عمومی اداره کل بهزیستی البرز


اینجا بهشت کودکان است! شاید دیوارهای رنگارنگی دارد و کودکان لباس‌های شیک و اسباب‌بازی‌های خوبی دارند و می‌خندند اما... آغوش مادر و دستان نوازشگر پدر را گم کرده‌اند. در عمق چشمان مریبان شیرخوار گاه بهزیستی استان البرز غم موج می‌زند و همیشه چشم انتظار ند مادر و پدر یکی از این کودکان شیرین زبان با دلتنگی به سراغ کوچولوهایشان بروند... برای آنها که از خانواده‌ها دورند.



فرزند امیر رضا حدوداً ۲ ساله و بدسرپرست می‌باشد و به علت نداشتن سرپرست موثر و حسب دستور مقام محترم قضایی در مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ توسط اورژانس اجتماعی کرج در بهزیستی پذیرش گردیده است. این آگهی جهت شناسایی والدین و سایر بستگان طفل چاپ شده است و صورت اطلاع از خانواده وی با شماره ۰۲۶-۳۳۵۱۸۱۸۸ تماس حاصل فرمایید.



فرزند سهند در مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ در بیمارستان کمالی متولد و رها گردیده است و به علت نداشتن سرپرست موثر و حسب دستور مقام محترم قضایی در مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ توسط مده کار بیمارستان کمالی در بهزیستی پذیرش گردیده است. این آگهی جهت شناسایی والدین و سایر بستگان طفل چاپ شده است و صورت اطلاع از خانواده وی با شماره ۰۲۶-۳۳۵۱۸۱۸۸ تماس حاصل فرمایید.



فرزند ثمن در مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ در بیمارستان کمالی متولد و رها گردیده است و به علت نداشتن سرپرست موثر و حسب دستور مقام محترم قضایی در مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ توسط مده کار بیمارستان کمالی در بهزیستی پذیرش گردیده است. این آگهی جهت شناسایی والدین و سایر بستگان طفل چاپ شده است و صورت اطلاع از خانواده وی با شماره ۰۲۶-۳۳۵۱۸۱۸۸ تماس حاصل فرمایید.



فرزند وحید در مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ در بیمارستان کمالی متولد و بدسرپرست می‌باشد و به علت نداشتن سرپرست موثر و حسب دستور مقام محترم قضایی در مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ توسط مده کار بیمارستان امام علی (ع) در بهزیستی پذیرش گردیده است. این آگهی جهت شناسایی والدین و سایر بستگان طفل چاپ شده است و صورت اطلاع از خانواده وی با شماره ۰۲۶-۳۳۵۱۸۱۸۸ تماس حاصل فرمایید.



نقش ویتامین C، قوت‌وروی در انسجام‌دهنده کمبود این مواد مغذی را مستعد بیماری‌های دندانی و لته مثل عفونت‌ها می‌کند. یکی از نشانه‌های بارز کمبود ویتامین C، خونریزی لثه‌هاست. افرادی که همیشه خونریزی دندانی دارند، باید به این نشانه‌ها توجه کنند. در صورت مشاهده این نشانه‌ها، بهتر است با پزشک خود مشورت کنید.

منتمان هابی برای زندگی. یکی از ضعف‌های غمبار روح، در در عین حال یکی از زورافروغ، طرز افکارهای آن در آن است که هوش آن جز به وساطت فن، امکان‌پذیر نیست.

تازه‌های سلامت

کدام مواد غذایی از پوسیدگی دندان‌ها پیشگیری می‌کنند؟

شاید همیشه وقتی در مورد پیشگیری از پوسیدگی دندان صحبت می‌شود، منتظر شنیدن نکاتی در مورد مسواک زدن و دندان‌نخل کشیدن باشید. اما مواد غذایی هم می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از پوسیدگی دندان داشته باشد.

به گزارش پیام آشنایه به نقل از دفتر بهداشتی جامعه وزارت بهداشت، وقتی بعضی مواد غذایی به دندان می‌چسبند و برای مدتی می‌مانند، توسط باکتری‌های عامل پوسیدگی در دهان مصرف‌شده و اسید تولید می‌شود که این اسید موجب آسیب به دندان‌ها و پوسیدگی می‌شود.

هر ماده غذایی که کربوهیدرات، خصوصاً قند داشته باشد و چسبندگی هم باشد مثل کراکر، چیپس، شکلات و شیرینی، میوه‌های مثل موز و کلمپوت و... مسبب اصلی پوسیدگی دندان است.

نقش ویتامین C، قوت‌وروی در انسجام‌دهنده کمبود این مواد مغذی را مستعد بیماری‌های دندانی و لته مثل عفونت‌ها می‌کند. یکی از نشانه‌های بارز کمبود ویتامین C، خونریزی لثه‌هاست. افرادی که همیشه خونریزی دندانی دارند، باید به این نشانه‌ها توجه کنند. در صورت مشاهده این نشانه‌ها، بهتر است با پزشک خود مشورت کنید.

به گزارش پیام آشنایه به نقل از دفتر بهداشتی جامعه وزارت بهداشت، وقتی بعضی مواد غذایی به دندان می‌چسبند و برای مدتی می‌مانند، توسط باکتری‌های عامل پوسیدگی در دهان مصرف‌شده و اسید تولید می‌شود که این اسید موجب آسیب به دندان‌ها و پوسیدگی می‌شود.